

Elektrocardiographische Untersuchungen bei kampfstoffvergifteten lungengeschädigten Tieren nach Behandlung mit Deriphyllin

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung des

Medizinischen Doktorgrades

an der

Friedrich-Wilhelms-Universität

zu Berlin

vorgelegt von

Horst Werner

aus Borna Bez. Leipzig

Tag der Promotion: 31. 1. 1940



Spezialbetrieb für Dissertationsdruck von Robert Noske in Borna-Leipzig

1939

M 434

Gedruckt mit Genehmigung der
Medizinischen Fakultät der Universität Berlin

Dekan: Prof. Dr. Kreuz
Referent: Doz. Dr. Muntzsch
Korreferent: Prof. Dr. Schürmann



Im Mittelpunkt der Vergiftung mit Grünkreuzkampfstoffen (Phosgen, Perstoff, Chlorpikrin) steht das akute toxische Lungenödem. Über die Entstehung des Lungenödems gehen heute die Anschauungen noch weit auseinander. Uns interessiert hier nur, daß es zu einem Austritt von Flüssigkeit aus den Kapillaren und einem Übertritt der Flüssigkeit in die Alveolen kommt. Dieser Vorgang hat als Folgen: daß 1. die Atemfläche der Lunge erheblich verkleinert wird, der respiratorische Gasaustausch gehemmt wird, und daß 2. der Austritt von Flüssigkeit aus den Gefäßen zu einer hochgradigen Eindickung des Restblutes, also zu einer Erhöhung der Blutviskosität führt. Das Herz ist dadurch vor die Aufgabe gestellt, gegen die mechanischen Widerstände im großen und besonders im kleinen Kreislauf anzukämpfen. Erschwert wird die Arbeit des Herzens noch dadurch, daß die durch das Lungenödem bedingte Anoxämie sich an dem schwer arbeitenden Herzmuskel besonders empfindlich bemerkbar macht. Die Folge dieses Mißverhältnisses zwischen Herzarbeit und Sauerstoffversorgung ist eine Herzmuskelschädigung, die zur Dilatation führt.

Die Therapie muß nun anstreben:

1. Mechanisch den venösen Teil des Kreislaufs zu entlasten.
2. Die Herztätigkeit durch „Herzmittel“ zu unterstützen.

Ersteres kann durch rechtzeitige Anwendung eines Aderlasses erreicht werden.

Über die Wahl von Herzmitteln bei Grünkreuzvergiftungen ist das Schrifttum einig, daß sich die Behandlung mit Strophanthin-Kampfer als die erfolgreichste erwiesen hat.

Die Purinderivate (Coffein, Theobromin, Theophyllin), deren Herzwirkung aus einer Frequenzsteigerung, Förderung der Erregungsleitung, Verstärkung der Systolen und Erweiterung der Kranzgefäße besteht, müßten, auch wegen des schnellen Wirkungseintrittes und der Möglichkeit der parenteralen Applikation, bei der Grünkreuzvergiftung besonders indiziert erscheinen. Bislang hat man sich aber gescheut, die Purinderivate in größeren Dosen hierbei anzuwenden, da die durch periphere Gefäßerweiterung eintretende Blutdrucksenkung zu Komplikationen führen kann.

Die bekannt gewordenen Erfolge bei Coronarsklerose, Myokardläsionen, Stauungen im kleinen Kreislauf, Asthma cardiale, Cheyne-Stokes mit einem Purinkörper, dem Theophyllin-Oxyamin (Deriphyllin), das zwar die Herzwirkung der Purinkörper besitzt, aber den Blutdruck weit weniger als die anderen Purinkörper beeinflussen soll, lenkten unsere Aufmerksamkeit auf dieses Präparat.

Die wirksame Komponente des Deriphyllin, das Theophyllin, hat als Lösungsvermittler ein Diäthanolamin, welches nicht nur das Theophyllin wasserlöslich und schnell resorbierbar machen, sondern auch gleichzeitig herztonisierend wirken soll.

L ü r m a n n und L a u e r (— 1 —) hatten gute Erfolge mit Deriphyllin bei cardialen Dekompensationen und Angina pectoris und berichten von einer wesentlich geringeren, nicht so plötzlich einsetzenden Blutdrucksenkung nach Deriphyllingabe im Gegensatz zu Euphyllin. Dasselbe bestätigte S c h ü b e l, Erlangen, in bisher unveröffentlichten Blutdruckversuchen an der Katze. Nämlich, daß das im Deriphyllin zur Anwendung gelangende Oxyamin den Blutdruck sogar geringfügig steigert. F r e y und H e ß (— 2 —) berichten über klinische und experimentelle Untersuchungen über Deriphyllin. Sie stellten im Tierexperiment mit der Reinschen Thermostromuhr eine einwandfreie Mehrdurchblutung der Kranzgefäße bei vorübergehender Senkung des Blutdruckes fest. Außerdem sei eine zentralanregende Wirkung in Form von Beschleunigung und Vertiefung der Atmung und Beschleunigung der Herzfrequenz beobachtet worden. Die Dauer der Wirkung der einzelnen Injektionen sei 20—30 Minuten. Beim Menschen sei die Steigerung der Kranzgefäßdurchblutung elektrocardiographisch festgestellt worden. Die zentralerregende und blutdrucksenkende Wirkung sei beim Menschen geringer als beim Tier.

A d d a r i i und F r e u n d l i c h (— 3 —) schreiben über den „Einfluß gefäßerweiternder Mittel beim experimentellen Koronararterienverschluß und die Gefäßwirkung des Methylenblauen“. An Katzen wurde festgestellt, daß Deriphyllin im Gegensatz zu anderen Theophyllinpräparaten den Blutdruck nicht senkt. Im EKG wurden geringe Veränderungen im Sinne der Besserung beobachtet. Nach Deriphyllingabe bei unterbundenem Ramus desc. der linken Kranzarterie zeigte sich im EKG eine Tendenz zu einer Hebung zur Nulllinie. In einigen Fällen soll sogar ein vorher negatives T zu einem positiven umgeschlagen sein.

Ebenso sei nach Deriphyllingabe eine Steigerung des Coronarminutenvolumens festgestellt worden. V. T ö r n e (— 4 —) stellt die geringblutdrucksenkende, coronarerweiternde und coronarspasmenlösende Wirkung des Deriphyllin fest. Bei Stauungen im kleinen Kreislauf seien dyspnoische Zustände rasch behoben worden. F a l t i t s c h e k (— 5 —) teilt gute Erfolge von Deriphyllin bei nächtlichem Cheyne-Stokes mit. L ü r m a n n (— 6 —) empfiehlt Deriphyllin bei Angina pectoris und Coronarthrombose bzw. Embolie. F. L e h r (— 7 —) stellt als Indikationen für Deriphyllin 3 Gruppen auf: 1. Coronarsklerose und Thrombose, 2. Überleitungsstörungen, 3. bradykarde Dekompensationen. Er hat elektrocardiographisch Besserungen des Herzbefundes festgestellt. R i s s m a n n (— 8 —) berichtet von guten Erfahrungen mit Deriphyllin bei stenokardischen Zuständen, Überleitungsstörungen und gefäßbedingten Herzneurosen. B r u n d i e c k (— 9 —) schreibt über seine Erfolge mit Deriphyllin bei Angina pectoris und cardialer Dekompensation. H a d o r n (— 10 —) beschreibt die coronarerweiternde Wirkung des Deriphyllin. B i b u s (— 11 —) stellt als Indikation für Deriphyllintherapie Coronarinsuffizienz, Myocardinfarkt, dyspnoische Zustände und Hochdruckbeschwerden. A. W e b e r (— 12 —) schreibt, daß Deriphyllin augenblicklich und für längere Zeit die Coronararterien erweitere. L u e g und R. W e b e r (— 13 —) betonen die gefäßerweiternde und diuretische Wirkung des Deriphyllin.

Die erwähnten Erfolge mit Deriphyllin veranlaßten uns, die Anwendung dieses Präparates als Cardiacum bei Phosgenvergiftungen zu untersuchen. Insbesondere verlockte die schnelle Resorbierbarkeit und die Möglichkeit, es in hohen Dosen zu geben, neben seiner coronarerweiternden Wirkung zu einer Verwendung bei Grünkreuzkampfstoffvergiftungen. Die beobachtete Blutdrucksenkung, die an sich Deriphyllin in unserem Falle kontraindiziert erscheinen ließe, ist nach allen Autoren so gering und kurz andauernd, daß sie nicht zu sehr ins Gewicht fällt.

Die Versuche wurden mit Hilfe des Elektrocardiographen ausschließlich an Kaninchen durchgeführt, weil diese Methode nicht nur den sichersten Aufschluß über den jeweiligen Zustand des Herzens gibt, sondern auch die einzige Möglichkeit zur genauen wiederholten Herzuntersuchung beim Tier bietet.

Wie die ersten Versuche zeigten, war es für die einwandfreie Abnahme der Elektrocardiogramme nötig, Versuchstier und Kontrolltier

durch Urethannarkose ruhig zu stellen. Der Gebrauch von Urethan soll nach Gildemeister das Krankheitsbild bei Phosgenvergiftung nicht beeinflussen. Von uns gemachte elektrokardiographische Aufnahmen bei Urethannarkosen ergaben normale Befunde. Wir gaben zunächst pro kg Tiergewicht 4,0 ccm einer 25% Urethanlösung. Nach Bedarf wurde im Verlauf des Versuches mehr gegeben. Weiterhin sahen wir, daß sich die Tiere dem in den Versuchsraum einströmenden Kampfstoff gegenüber sehr unterschiedlich verhielten. Durch die stark voneinander abweichende Atemfrequenz und -tiefe nahmen die Tiere auch verschiedene Kampfstoffmengen auf. Die dadurch entstehende Fehlerquelle wurde durch die Urethannarkose ausgeschaltet, in der eine gleichmäßige Beatmung erzielt wurde. Von den in Rückenlage narkotisierten und angeschnallten Tieren erfolgte die Stromabnahme von den Extremitäten mittels subcutan eingeführter Silbernadel-Elektroden. Es wurde darauf geachtet, daß Versuchstier und Kontrolltier nach Möglichkeit einem Wurf entstammten, zumindest aber gleiche Größe, Gewicht und Haarfarbe hatten. Vor Beginn jeder Vergiftung wurde von beiden Tieren ein Normal-EKG gemacht, um zu vermeiden, daß ein bereits herzkrankes Tier verwendet wurde. Die Vergiftung erfolgte nach der von Gildemeister (— 14 —) beschriebenen Methode mit wechselnden vol. c. t.-Mengen.

In Vorversuchen wurde festgestellt, daß eine häufige intramuskuläre Deriphyllingabe von 0,25 ccm Deriphyllin gleich 0,1 g Deriph. pro kg Tiergewicht und Dosis gut vertragen wurde.

Wie aus den folgenden Versuchsprotokollen ersichtlich ist, bekam das Versuchstier in mehrstündlichen Abständen 0,25 ccm Deriph. pro kg Tiergewicht intramuskulär injiziert. Die Abnahme der Elektrokardiogramme erfolgte dann bei Versuchs- und Kontrolltier hintereinander in mehrstündlichen Abständen.

Bei der Auswertung der Elektrokardiogramme deuteten wir als Myokardschaden: Verbreiterung und Knotung des Kammerkomplexes und Veränderungen des ST-Stückes und der T-Zacke in Form einer Senkung des ST-Stückes unterhalb der isoelektrischen Linie, einer Abflachung oder Negativwerden der T-Zacke in mindestens zwei Ableitungen. Als Zeichen für einen Infarkt nahmen wir als Frühfolge das Auftreten des sogenannten koronaren T und als Spätfolge ein unter der Nulllinie verlaufendes konvexes ST-Intervall mit negativer T-Zacke.

5 Versuche mit 600 ct.

Versuch I.

Nr. 445 Deriphyllintier		Nr. 446 Kontrolltier	
Normal-Ekg: kein pathol. Befund Frequenz : 240		Normal-Ekg: kein pathol. Befund Frequenz : 240	
Vergiftung mit 6000 vol. ct. in Urethannarkose			
6 ¹ / ₂ Std. nach Vergiftung: — 0,5 ccm Deriph. intram.			
14 Std. nach Vergiftung: — 0,5 ccm Deriph. intram.			
15 Std. nach Vergiftung:			
Ekg:		Frequenz: 300	
I. P negativ, T negativ		Ekg:	
II. T isoelektrisch		Frequenz: 180	
III. o. B.		I. } II. } kein pathologischer Befund III. }	
Deutlicher Myocardschaden			
16 Std. 0,5 ccm Deriph. intram.			
16 ¹ / ₂ Std.			
Ekg:		Frequenz: 300	
I. T negativ, P negativ		Ekg:	
II. tiefer Abgang des ST-Stückes.		Frequenz: 240	
T isoelektrisch		I. QRS gespalten, T negativ	
III. o. B.		II. ST-Stück verläuft gesenkt	
		III. o. B.	
Beginnender Myocardschaden			
Deutlicher Myocardschaden. Nach Abl. II kann Coronarverschluß erwartet werden			
18 ¹ / ₂ Std.			
Ekg:		Frequenz: 300	
I. ST-Stück hoher Abgang		Ekg:	
II. o. B.		Frequenz: 180	
III. tiefer Abgang des ST-Stückes.		I. T isoelektrisch bis negativ	
T flach bis isoelektrisch		II. o. B.	
		III. T flacher werdend	
Beginnender Myocardschaden			
Myocardschaden scheint gebessert. Zeichen für Coronarverschluß vorhanden			
19 ¹ / ₂ Std. 0,75 ccm Deriph. intram.			

21	Std.	Ekg: Frequenz: 240 I. verzittert, unlesbar II. tiefer Abgang des ST-Stückes III. " " " " Zustand unverändert	Ekg: Frequenz: 180 I. T negativ II. o. B. III. T flach Myocardschaden
25	Std.	0,5 ccm Deriph. intram. Ekg: Frequenz: 240 I. o. B. II. T negativ, ST-Stück gesenkt III. T " " " Myocardschaden. Kein deutliches Zeichen für Coronarverschluß. Zustand scheint gegenüber dem Ekg von 18 ¹ / ₂ Std. etwas gebessert	Ekg: Frequenz: 180 I. negatives T II. gesenktes ST-Stück III. o. B. Unveränderter Myocardschaden
27	Std.	Exitus Die Sektion ergab ein Lungenoedem. Das Herz war rechts dilatiert, links nicht dilatiert. Im Herzen ungeschichtetes Blutgerinnsel	27 Std. — Ekg: Frequenz: 160 Verlängerte Überleitungszeit I. negatives T II. gesenktes ST-Stück III. o. B.
31 Std. — Exitus			

Zusammenfassung:

Beide Tiere sterben ungefähr zur gleichen Zeit.

Elektrokardiographisch zeigen beide Tiere einen Myocardschaden. Das Versuchstier zeigte eine geringgradige Besserung nach dem EKG 16¹/₂ Stunden nach der Vergiftung insofern, als das negative T₁ und das isoelektrische T₂ verschwindet. Allerdings sind gleichzeitig Zeichen für einen akuten Coronarverschluß sichtbar.

Versuch 2.

Nr. 756
Deriphyllintier

Nr. 757
Kontrolltier

Normal-Ekg: o. B.
Frequenz : 300

o. B.
300

Vergiftung mit 6000 vol. ct. in Urethannarkose

13¹/₃ Std. nach Vergiftung. — 0,5 ccm Deriph. intram.

14 ¹ / ₂ Std.	Ekg:	Frequenz: 360	Ekg:	Frequenz: 300
	I. T isoelektrisch		I. o. B.	
	II. o. B.		II. T etwas flach	
	III. o. B.		III. o. B.	
	Noch kein sicherer Anhalt für einen Myocardschaden		Kein Anhalt für einen Myocard-schaden	

16 Std. 0,75 ccm Deriph. intram.

16 ¹ / ₂ Std.	Ekg:	Frequenz: 300	Ekg:	Frequenz: 240
	I. T isoelektrisch bis negativ		I. T isoelektrisch	
	II. o. B.		II. T weiter flacher werdend	
	III. o. B.		III. T etwas flach	
	Beginnender leichter Myocardschaden		Läßt Myocardschaden erwarten	

18¹/₂ Std. 0,5 ccm Deriph. intram.

18 ³ / ₄ Std.	Ekg:	Frequenz: 300	Ekg:	Frequenz: 240
	I. Beginnender hoher ST-Abgang		I. T isoelektrisch bis negativ	
	II. negatives T, flaches ST		II. T flach bis isoelektrisch	
	III. tiefer Abgang vom ST-Stück		III. beginnender hoher Abgang des ST-Stückes	
	Zeichen eines Coronarinfarktes in I deutlich vorhanden. Abl. III deutet auch darauf. Das negative T ₁ deutet auf Myocardschaden		Leichter Myocardschaden	

20¹/₂ Std. 0,5 ccm Deriph. intram.

20 ³ / ₄ Std.	Ekg:	Frequenz: 300	Ekg:	Frequenz: 240
	I. Fortschreitender hoher Abgang des ST-Stückes		I. isoelektrisches T	
	II. T flach; beginnender tiefer Abgang von ST		II. T flach bis isoelektrisch	
	III. Tiefer Abgang des ST-Stückes		III. T sehr flach	
	Coronarinfarkt; leichter Myocard-schaden		Unveränderter leichter Myocard-schaden	

22¹/₂ Std. 0,5 ccm Deriph. intram.

	Ekg:	Frequenz: 240	Ekg:	Frequenz: 240
	I. Stark hoher Abgang von ST. neg. T ₁		I. isoelektrisches T	
	II. Tiefer Abgang von ST		II. T isoelektrisch bis negativ	
	III. " " " "		III. T flach	
	Coronarinfarkt und Myocardschaden sehr deutlich		Unverändert	

24 ¹ / ₂ Std.	0,75 Deriph. intram. Ekg: Frequenz: 240 I. } unverändert gegen Ekg von II. } 22 ¹ / ₂ Stunden III. }	Ekg: Frequenz: 240 I. } II. } unverändert III. }
	Zustand unverändert	Zustand unverändert
25 ³ / ₄ Std.	0,5 ccm Deriph. intram.	
26 Std.	Ekg: Frequenz: 240 Unverändert gegen 22 ¹ / ₂ Std.	Ekg: Frequenz: 240 Unverändert gegen 22 ¹ / ₂ Std.
30 Std.	Ekg: Frequenz: 180 I. Sehr tiefes negatives T ₁ , geringer hoher Abgang von ST II. P-Aufspaltung, tiefer Abgang von ST III. P-Aufspaltung, tiefer ST-Abgang Bradykardie; P-Aufspaltung deutet auf intraaurikulären Leitungsschaden. Zustand eines schweren Myocard-schadens und Coronarinfarktes	Ekg: Frequenz: 240 I. } unverändert II. } III. negatives T ₃ Zustand unverändert. Leichter Myocardschaden
30 Std. + 5 Min.	— 0,5 ccm Deriphyllin Ekg: Exitus während des Ekg's I. } Extrasystolen, Schenkelblock. II. } Stark verlängerte Überleitungs- III. } zeit. Bradykardie und Exitus Tier stirbt unter den Zeichen eines schweren Myocardschadens. Die Sektion ergab eine kaum vergrößerte Lunge mit geringen emphysematösen Randbezirken. Es bestand ein mäßiges Oedem. Am Herz waren beide Vorhöfe und Kammern kontrahiert. Blutleer!	31 ¹ / ₄ Std. — Ekg: Frequenz: 180 I. T flach bis isoelektrisch II. T „ „ „ III. negativ Bradykardie, leichter Myocard-schaden 38 ³ / ₄ Std. — Ekg: Frequenz: 120 I. } T ₁ , T ₂ , T ₃ negativ; ver- II. } längerte Überleitungszeiten III. }
		Deutlicher Myocardschaden

39¹/₂ Std. — Atmung nicht mehr sichtbar.
Im Ekg gelegentliche Ausschläge bis zum Exitus, nach 39¹/₂ Std. + 7 Min. Schenkelblock
Die Sektion ergab mäßig vergrößerte Lungen. Oedem vorhanden. An der Hinterfläche des rechten Oberlappens ein Infarkt. Am Herzen bestand mäßige Dilatation. In den Ventrikeln ungeschichtetes Blutgerinnsel.

Zusammenfassung:

Beide Tiere zeigen im letzten EKG einen deutlichen Myocardschaden. Kein Unterschied beim Frequenzabsinken. Elektrokardiographisch keine Besserung sichtbar.

Versuch 3.

Nr. 318
Deriphyllintier

Nr. 319
Kontrolltier

Normaltier-Ekg: o. B.
Frequenz : 300

Normal-Ekg: o. B.
Frequenz : 300

Vergiftung mit 6000 vol. ct. in Urethannarkose

2 ¹ / ₂ Std. nach Vergiftung. — 0,75 ccm Deriph. intram.			
8 Std.	Ekg: I. T isoelektrisch II. ST-Stück verläuft gesenkt III. o. B. Läßt Myocardschaden erwarten	Frequenz: 300	Ekg: I. II. } ohne patholog. Befund III. }
9 ¹ / ₂ Std.	0,75 ccm Deriph. intram. Ekg: I. T ₁ negativ II. T sehr flach bis negativ III. o. B. Deutlicher Myocardschaden	Frequenz: 300	Ekg: I. T flach bis negativ II. T flach III. o. B. Läßt Myocardschaden erwarten
16 ¹ / ₂ Std.	Ekg: I. T negativ II. ST-Stück tiefer Abgang, T negativ III. o. B. Deutlicher Myocardschaden 0,75 ccm Deriph. intram.	Frequenz: 240	Ekg: I. II. } kein patholog. Befund III. }
19 Std.	Ekg: I. II. } unverändert gegen Ekg von III. } 16 ¹ / ₂ Std.	Frequenz: 240	Ekg: I. II. } kein pathologischer Befund III. }
22 Std.	0,75 ccm Deriph. intram. Ekg: I. II. } Zustand unverändert III. }	Frequenz: 240	Ekg: I. ST-Stück verläuft negativ II. o. B. III. o. B. Läßt Coronarinfarkt erwarten
24 ¹ / ₂ Std.	Ekg: I. Tiefes negatives T, gesenktes ST II. „ „ T, „ ST III. Tier stirbt während der Ableitung nach 24 ¹ / ₂ Std. unter dem Zeichen einer schweren Myocardlaesion Die Sektion ergab ein mittleres Oedem, am Herzen mäßige Dilatation	Frequenz: 180	Ekg: I. ST-Stück verläuft gesenkt. Tiefer Abgang d. ST-Stückes II. ebenso III. o. B. Läßt auf Coronarinfarkt schließen. Exitus nach 47 Std. nach Vergiftung

Zusammenfassung:

Versuchstier stirbt unter sich verschlechterndem EKG, während das Kontrolltier nur geringgradig veränderte EKG's zeigt und 23 Stunden länger lebt. Kein Frequenzunterschied. Keine Besserung elektrokardiographisch bei dem Versuchstier sichtbar.

Versuch 4.

Nr. 242		Nr. 243	
Deriphyllintier		Kontrolltier	
Normal-Ekg: o. B.		Normal-Ekg: o. B.	
Frequenz : 300		Frequenz : 300	
Vergiftung mit 6000 vol. ct. in Urethannarkose			
5 Std. nach Vergiftung.	— 0,75 ccm Deriph. intram.		
7 Std. nach Vergiftung:	Ekg:	Frequenz: 300	Ekg: Frequenz: 240
	I. } kein pathologischer Befund	I. }	I. }
	II. }	II. }	II. }
	III. }	III. }	III. }
8 Std.	0,75 ccm Deriph. intram.		
13 Std.	0,75 cm Deriph. intram.		
	Ekg:	Frequenz: 300	Ekg: Frequenz: 240
	I. T stark negativ	I. }	I. }
	II. o. B.	II. }	II. }
	III. o. B.	III. }	III. }
	Deutlicher Myocardschaden		
17 Std.	0,75 ccm Deriph. intram.		
	Ekg:		Ekg: Frequenz: 180
	I. T weniger stark negativ als im vorhergehenden Ekg	I. }	I. }
	II. o. B.	II. }	II. }
	III. o. B.	III. }	III. }
	Myocardschaden scheint gebessert		
20 Std.	Tier †		
	Die Sektion ergab: Mäßiges Lungen- oedem und geringe Dilatation des Herzens		
		21 Std. — Ekg:	Frequenz: 180
		I. }	I. }
		II. }	II. }
		III. }	III. }
		22 ¹ / ₂ Std. — Ekg:	Frequenz: 180
		I. T isoelektrisch	I. }
		II. o. B.	II. }
		III. o. B.	III. }
		Läßt beginnenden Myocard- schaden erwarten	
		36 Std. — Tier †	
		Die Sektion ergab ein mittleres Lungenoedem. Am Herzen war die rechte Kammer dilatiert	

Zusammenfassung:

Besserung des letzten EKG's gegenüber dem von 13 Stunden nach Vergiftung insofern, als das stark negative T₁ flacher wird. Trotzdem nach 20 Stunden Tod, wahrscheinlich infolge akuter Erstickung. Frequenz bei dem Versuchstier nicht gesunken. Elektrokardiographisch läßt sich eine geringgradige Besserung bei dem mit Deriphyllin behandelten Tier feststellen.

Versuch 5.

Nr. 274
Deriphyllintier

Nr. 275
Kontrolltier

Normal-Ekg: o. B.
Frequenz : 300

Normal-Ekg: o. B.
Frequenz : 300

Vergiftung mit 6000 vol. ct. in Urethannarkose

4 $\frac{1}{2}$ Std. nach Vergiftung:

0,75 ccm Deriph. intram.

Ekg: Frequenz: 300

I. }
II. } kein pathologischer Befund
III. }

Ekg: Frequenz: 300

I. o. B.
II. o. B.
III. T. isoelektrisch

Kein pathologischer Befund

18 Std. 0,5 ccm Deriph. intram.

Ekg: Frequenz: 340

I. }
II. } kein pathologischer Befund
III. }

Ekg: Frequenz: 340

I. }
II. } kein pathologischer Befund
III. }

20 Std. 0,5 ccm Deriph. intram.

Ekg: Frequenz: 360

I. o. B.
II. T flach
III. T isoelektrisch bis flach

Noch kein Anhalt für einen Myocard-
schaden

Ekg: Frequenz: 340

I. o. B.
II. o. B.
III. T flach bis isoelektrisch

Kein pathologischer Befund

20 $\frac{1}{2}$ Std. 0,5 ccm Deriph. intram.

22 Std. Ekg: Frequenz: 360
Unverändert gegen 20 Std. n. Vergiftg.

Ekg: Frequenz: 360
Unverändert gegen 20 Std. n. Verg.

24 Std. 0,5 ccm Deriph. intram.

Ekg: Frequenz: 360
Unverändert

Ekg: Frequenz: 360
Unverändert

27 Std. Ekg: Frequenz: 340
Unverändert

Ekg: Frequenz: 360
Unverändert

33 $\frac{1}{2}$ Std. 0,5 ccm Deriph. intram.

34 Std. Ekg: Frequenz: 300
Unverändert

Ekg: Frequenz: 300
Unverändert

41 Std. 0,5 ccm Deriph. intram.

Ekg: Frequenz: 300
Unverändert

Ekg: Frequenz: 360
Unverändert

44 Std. 0,5 ccm Deriph. intram.

Ekg: Frequenz: 300
Unverändert

Ekg: Frequenz: 300
Unverändert

Nr. 274 Deriphyllintier		Nr. 275 Kontrolltier	
47 Std.	0,5 ccm Deriph. intram. Ekg: Frequenz: 300 Unverändert	Ekg: Frequenz: 300 Unverändert	
49 ¹ / ₂ Std.	0,5 ccm Deriph. intram. Ekg: Frequenz: 300 Unverändert Noch keinen Anhalt für einen Myocardschaden	Ekg: Frequenz: 300 Unverändert Kein pathologischer Befund	
53 ¹ / ₂ Std.	Exitus † Die Sektion ergab ein erhebliches Lungen-Oedem. Lungen stark emphysematös verändert Am Herzen waren beide Ventrikel stark dilatiert. In den Kammern ungeschichtetes Blutgerinnsel	55 Std. — Ekg: Frequenz: 300 I. T deutlich negativ II. o. B. III. o. B. Myocardschaden vorhanden 92 Std. — Ekg: Frequenz: 60 Bradykardie I. Verl. Überleitungszeit II. Tiefes negatives T ₂ II. „ „ T ₃ Schwerer Myocardschaden 95 ¹ / ₂ Std. — Ekg: Frequenz: 60 Bradykardie I. o. B. II. T regelmäßig wechselnd positiv und negativ III. T wechselnd pos. und neg. Schwerer Myocardschaden. Für das wechselnde T ₂ und T ₃ kann keine Deutung gegeben werden, wahrscheinlich Durchblutungsstörung und kein organ. Schaden 96 ¹ / ₉ Std. — Exitus † Die Sektion ergab eine emphysematöse, oedematöse Lunge. Das Herz war nicht besonders dilatiert. Im linken Ventrikel geschichtetes, im rechten Ventrikel ungeschichtetes Blutgerinnsel	

Zusammenfassung:

Das Versuchstier stirbt, obwohl elektrokardiographisch kein Anhalt für einen Myocardschaden vorhanden war, wohingegen das Kontrolltier mit deutlich sichtbarem Herzbefund 40 Stunden länger lebt. Das mit Deriphyllin behandelte Tier zeigt bis zum Tode normale EKG's und kein Absinken der Frequenz.

3 Versuche mit 8000 ct.

Versuch 6.

Nr. 714
Deriphyllintier

Nr. 715
Kontrolltier

Normal-Ekg: o. B.
Frequenz : 360

Normal-Ekg: o. B.
Frequenz : 360

Vergiftung in Narkose mit 8000 vol. ct.

8 Std. nach Vergiftung — 1,0 ccm Deriph. intram.

8 Std. — Exitus

Die Sektion ergab ein mächtiges Lungen-Oedem. Geringe Dilatation des Herzens.

16 Std. nach Vergiftung — 1,0 ccm Deriph. intram.

19 Std. Ekg: Frequenz: 360
I. ST-Stück tiefer Abgang, T flach
II. ST-Stück tiefer Abgang, T wird im Laufe des Ekg immer flacher u. neg.
III. o. B.

Beginnender Myocardschaden. Zeichen von Coronarverschlus sind vorhanden.

19¹/₄ Std. 0,5 ccm Deriph. intram.

21¹/₄ Std. 0,5 ccm Deriph. intram.

21¹/₂ Std. Ekg: Frequenz: 360
nur I. Abl.: o. B.

26¹/₂ Std. 0,5 ccm Deriph. intram.
Ekg: Frequenz: 300
In allen Abl. Extrasystolen (ventricul.)
I. negat. T, ST tiefer Abgang
II. ST verl. gesenkt, T isoelekt. bis neg.
III. o. B.
Schwerer Myocardschaden

28¹/₂ Std. Ekg: Tier stirbt im Verlaufe der Ekg's
I. Frequenz noch normal, ST-Stück II gesenkt, T isoelekt. bis neg. Verlängerte Überleitungszeit
nach 1 Min. II. Frequenz sehr verlangsamt, P fehlt (A-V), T neg., tiefer, bogenförmiger Abgang des ST-Stückes
nach 2 Min. II. Frequenz besser, negat. T₂, gesenktes ST-Stück
nach 4 Min. III. Frequenz besser, aber unregelmäßig. Verbreitertes gespaltenes QRS, Arborisationsblock. Es folgt Schenkelblock und Exitus.

Tier stirbt unter den Erscheinungen eines schweren Myocardschadens und Coronarverschlusses.

Sektion ergab starkes Oedem der Lunge. Ränder aller Lungenlappen stark emphysematös verändert. Herz beiderseits deutlich dilatiert.

Zusammenfassung:

Das Kontrolltier stirbt 8 Stunden nach der Vergiftung, wahrscheinlich an akuter Erstickung. Das Versuchstier lebte 20 Stunden länger und zeigte fortlaufend pathologische EKG's ohne einen Anhalt für eine Besserung zu bieten.

Versuch 7.

Nr. 364		Nr. 365	
Deriphyllintier		Kontrolltier	
Normal-Ekg: o. B.		Normal-Ekg: o. B.	
Frequenz : 300		Frequenz : 360	
Vergiftung mit 8000 vol. ct. in Urethannarkose			
17 ¹ / ₂ Std. nach Vergiftung—0,75ccm Deraph.intram.			
19 ¹ / ₂ Std.	Ekg: I. T flach II. T isoelekt. III. o. B. Läßt Myocardschaden erwarten	Frequenz: 360	Ekg: I. T. flach II. o. B. III. T flach bis isoelekt. Noch kein Anhalt für einen Myocardschaden
20 Std.	0,5 ccm Deriph. intram.		
23 Std.	0,5 ccm Deriph. intram.		
24 ¹ / ₂ Std.	Ekg: I. ST-Stück verläuft gesenkt II. T isoelekt. III. P neg., T neg. Leichter Myocardschaden	Frequenz: 360	Ekg: I. o. B. II. o. B. III. T isoelekt. Kein patholog. Befund
27 Std.	0,5 ccm Deriph. intram.		
27 ¹ / ₂ Std.	Ekg: Unverändert	Frequenz: 360	Ekg: Unverändert Frequenz: 360
29 ¹ / ₄ Std.	0,5 ccm Deriph. intram. Ekg: Unverändert	Frequenz: 300	Ekg: Unverändert Frequenz: 360
31 ¹ / ₄ Std.	0,5 ccm Deriph. intram. Ekg: I. ST-Stück verläuft gesenkt II. T isoelekt., beginnender tiefer Abgang des ST-Stückes III. T flach Leichter Myocardschaden	Frequenz: 300	Ekg: Unverändert Frequenz: 360

36	Std.	Ekg: Frequenz: 240 I. ST-Stück verläuft stark gesenkt, T wird negativ II. ST-Stück gesenkt, T isoelekt. bis negativ III. T flach Sichtbarer Myocardschaden. Abl. I und II deuten auf Coronarverschluß	Ekg: Frequenz: 360 I. T isoelekt. II. T flach III. T isoelekt. Leichter Myocardschaden
39	Std.	Exitus + Die Sektion ergab ein enormes Lungen- oedem. Das Herz wies keine Dilatation auf	75 Std. — Ekg: Frequenz: 240 I. o. B. II. o. B. III. flaches T ₃ Myocardschaden behoben 80 Std. — Ekg: Frequenz: 240 I. o. B. II. o. B. III. o. B., flaches T ₃ Kein Anhalt für einen Myocard- schaden 86 Std. — Exitus + Die Sektion ergab ein geringes Lungenoedem. Das Herz war beiderseits dilatiert und mit un- geschichtetem Blut gefüllt

Zusammenfassung:

Das Versuchstier stirbt 39 Stunden nach Vergiftung und zeigt fortlaufend sich verschlechternde EKG's. Das Kontrolltier lebte 45 Stunden länger und hatte am Schluß ein normales EKG. Es zeigte eine vorübergehende Besserung insofern, als ein isoelektrisches T₁ und flaches T₂ wieder normal wurden. Kein Frequenzunterschied bei beiden Tieren.

Versuch 8.

Nr. 265		Nr. 266	
Deriphyllintier		Kontrolltier	
Normal-Ekg: o. B. Frequenz : 300		Normal-Ekg: o. B. Frequenz : 300	
Vergiftung mit 8000 vol. ct. in Urethannarkose			
4 ¹ / ₂ Std. nach Vergiftung — 0,5 ccm Deriph. intram.			
7	Std.	0,5 ccm Deriph. intram.	
8	Std.	Ekg: Frequenz: 360	Ekg: Frequenz: 360
		I. } II. } III. } kein patholog. Befund	I. } neg. T ₁ II. } III. } o. B.
Myocardschaden			
10 ¹ / ₂	Std.	0,5 ccm Deriph. intram.	
		Ekg: Frequenz: 300	Ekg: Frequenz: 340
		Kein patholog. Befund	I. negt. T ₁ II. o. B. III. o. B.
Myocardschaden			
17	Std.	0,5 ccm Deriph. intram.	
		Ekg: Frequenz: 120	Ekg: Frequenz: 300
		Bradykardie	Unverändert
		Sonst kein patholog. Befund!	
17	Std.	Exitus +	
		Die Sektion ergab: Erhebliches Lungenödem und Emphysem. Das Herz war deutlich dilatiert, aber fast blutleer	20 Std. — Ekg: Frequenz: 300 Unveränderter Myocardschaden Tier überlebt

Zusammenfassung:

Das Versuchstier stirbt nach 19 Stunden ohne pathologischen EKG-Befund; akutes Frequenzsinken 2 Stunden vor dem Tode. Das Kontrolltier überlebt, obwohl überall Zeichen für einen Myocardschaden vorhanden sind.

5 Versuche mit 10000 vol. ct.

Versuch 9.

Nr. 712

Deriphyllintier

Nr. 713

Kontrolltier

Normal-Ekg: o. B.

Frequenz : 300

Normal-Ekg: o. B.

Frequenz : 300

Vergiftung mit 10000 vol. ct. ohne Narkose

Tiere verhalten sich aber gleichartig

2 Std. nach Vergiftung. — 1,0 ccm Deriph. intram.

3¹/₂ Std. 0,5 ccm Deriph. intram.

5¹/₂ Std. Ekg: Frequenz: 300

I. o. B.

II. o. B.

III. T negativ

Kein pathologischer Befund

Ekg: Frequenz: 240

I. T flach bis isoelektrisch

II. o. B.

III. o. B.

Noch keine Anzeichen für eine Myocardschädigung

7 Std. 0,5 ccm Deriph. intram.

7¹/₄ Std. Ekg: Frequenz: 300

I. o. B.

II. T flach werdend

III. T isoelektrisch

Noch kein deutliches Zeichen für einen Myocardschaden

Ekg: Frequenz: 240

Unverändert

11 Std. 0,5 ccm Deriph. intram.

Ekg: Frequenz: 300

I. T negativ

II. T negativ

III. o. B.

Deutlicher Myocardschaden

Ekg: Frequenz: 180

Unverändert

15¹/₂ Std. Ekg: Frequenz: 300

I. T flach bis isoelektrisch

II. T flach bis isoelektrisch

III. T flach negativ

Myocardschaden gebessert

Ekg: Frequenz: 120

I. beginnende Senkung des ST-Stückes

II. P gespalten, T flach

III. P gespalten

Beginnender leichter Myocard-schaden

21 Std. Ekg: Frequenz: 240

I.

II.

III.

o. B.

Myocardschaden behoben

Ekg: Frequenz: 60

Bradykardie

I. negativ

II. T negativ, ST-Stück gesenkt

III. T negativ

Schwerer Myocardschaden

Nr. 712		Nr. 713	
Deriphyllintier		Kontrolltier	
23 ^{1/2} Std.	0,5 ccm Deriph. intram.		
24 Std.	Ekg:	Frequenz: 240	23 Std. — Exitus †
	I. o. B.		Die Sektion ergibt ein erhebliches
	II. o. B.		Lungenoedem und Emphysem
	III. T flach bis negativ		Das rechte Herz ist mäßig, das
	Kein pathologischer Befund		linke wenig dilatiert
27 Std.	1,0 ccm Deriph. intram.		
	Ekg:	Frequenz: 240	
	I. o. B.		
	II. o. B.		
	III. flaches T		
	Kein pathologischer Befund		
† Exitus innerhalb der nächsten 8 Stunden			
Die Sektion ergibt ein großblasiges Emphysem, mäßiges Oedem. Am Herzen war geringe Dilatation, rechte Kammer deutlicher dilatiert als linke. Im Herzen ungeschichtetes Blutgerinnsel.			

Zusammenfassung:

Besserung des EKG-Befundes des mit Deriphyllin behandelten Tieres zwischen dem EKG 11 Stunden nach der Vergiftung und 21 Stunden insofern, als ein vorher negatives T₁ und T₂ verschwindet. Tod bei einem 8 Stunden vor Exitus aufgenommenen normalen EKG.

Versuch 10.

Nr. 605
Deriphyllintier

Nr. 608
Kontrolltier

Normal-Ekg: o. B.
Frequenz : 300

Normal-Ekg: o. B.
Frequenz : 300

Vergiftung mit 10000 vol. ct. in Urethannarkose

1¹/₂ Std. nach Vergiftung:

0,5 ccm Deriph. intram.

Ekg: Frequenz: 240

I. o. B.

II. Tiefer Abgang des ST-Stückes,
negatives T₂

III. T negativ

Myocardschaden sichtbar

Ekg: Frequenz: 240

I. o. B.

II. o. B.

III. T isoelektrisch

Kein pathologischer Befund

6 Std.

Ekg: Frequenz: 300

I. }
II. } o. B.
III. }

Myocardschaden behoben

Ekg: Frequenz: 240

I. T isoelektrisch

II. o. B.

III. o. B.

Kein pathologischer Befund

6¹/₂ Std.

0,75 ccm Deriph. intram.

11 Std.

0,75 ccm Deriph. intram.

19 Std.

0,75 ccm Deriph. intram.

24 Std.

0,75 ccm Deriph. intram.

24¹/₂ Std.

Ekg: Frequenz: 120

I. T negativ

II. ST-Stück tiefer Abgang, T tief
negativ

III. ST-Stück tiefer Abgang, T ne-
gativ

Deutlicher Myocardschaden

Ekg: Frequenz: 120

I. T isoelektrisch

II. o. B.

III. o. B.

Kein pathologischer Befund

25¹/₂ Std.

Ekg: Frequenz: 180

I. T negativ

II. ST-Stück tiefer Abgang, T flach
positiv

III. o. B.

Zustand scheint etwas gebessert, Myo-
cardschaden noch vorhanden

Ekg: Frequenz: 120

Unverändert

26 Std.

Exitus †

Die Sektion zeigt Lungenödem und
-emphysem

Am Herzen mäßige Dilatation

26¹/₂ Std. — Ekg: Frequenz: 120

I. T isoelektrisch

II. T flach

III. Geringer hoher Abgang des
ST-Stückes

Leichter Myocardschaden

27 $\frac{1}{2}$ Std. — Ekg: Frequenz: 120
I. T isoelektrisch
II. o. B.
III. Hoher Abgang des St-Stückes
Leichter Myocardschaden. III. Abl. deutet Coronarverschluß an
28 $\frac{1}{2}$ Std. — Ekg: Frequenz: 120
Unverändert
30 $\frac{1}{2}$ Std. — Ekg: Frequenz: 120
Unverändert
31 $\frac{1}{2}$ Std. — Ekg: Frequenz: 120
Unverändert
34 $\frac{1}{2}$ Std. — Ek: Frequenz: 120
Bradykardie
I. T negativ
II. o. B.
III. o. B.
Deutlicher Myocardschaden
34 $\frac{3}{4}$ Std. — Ekg: Frequenz: 120
Bradykardie
Exitus während der Ekg's
I. Tiefes negat. T
II. Ausschläge unregelmäßig flach negat. T
III. Exitus
Tier stirbt unter den Erscheinungen eines erheblichen Myocardschadens

Zusammenfassung:

Das Versuchstier zeigt eine zeitweise Besserung zwischen dem EKG von 1 $\frac{1}{2}$ Stunden und 6 Stunden nach Vergiftung insofern, als ein negatives T₂ und T₃ verschwinden. Doch später Auftreten eines deutlichen Myocardschadens, dem entsprechend auch die Frequenz absinkt.

Versuch II.

Nr. 694

Deriphyllintier

Nr. 689

Kontrolltier

Normal-Ekg: o. B.

Frequenz : 300

Normal-Ekg: o. B.

Frequenz : 240

Vergiftung mit 10000 vol. ct. ohne Narkose

Tier während der Vergiftung sehr unruhig, springt umher, heftiges Atmen

Tier während der Vergiftung ganz ruhig, atmet flach

30 Min. nach Vergiftung. — 0,65 ccm Deriph. intrav.

18 Std. 0,65 ccm Deriph. intram.

21 Std. Ekg: Frequenz: 300
I. Spaltung von QRS
II. o. B.
III. o. B.
Kein Anhalt für einen Myocard-schaden

Ekg: Frequenz: 300
Kein pathologischer Befund

23 Std. Ekg: Frequenz: 300
I. o. B.
II. QRS-Spaltung
III. o. B.
Kein Anhalt für einen Myocard-schaden

Ekg: Frequenz: 240
I. o. B.
II. T flach
III. o. B.
Läßt Myocardschaden erwarten

24 Std. 0,75 ccm Deriph. intram.

27¹/₂ Std. Ekg: Frequenz: 300
I. unlesbar
II. QRS gespalten
III. o. B.
Noch kein Anhalt für einen Myocard-schaden

Ekg: Frequenz: 180
Bradykardie
I. o. B.
II. T wird sichtbar flacher und schließlich isoelektrisch
III. T negativ
Beginnender Myocardschaden

41 Std. 0,75 ccm Deriph. intram.

44 Std. Ekg: Frequenz: 300
0,75 ccm Deriph. intram.
I. negativ. T
II. T sehr flach
III. o. B.
Deutlicher Myocardschaden

Nach ca. 32 Std.
Exitus †
Die Sektion: Ein erhebliches Lungenoedem mit Emphysem. Das Herz ist beiderseits, besonders aber rechts, dilatiert. Die Kammern sind mit ungeschichtetem Gerinnsel gefüllt

45 Std. Exitus †
Die Sektion ergab Lungenoedem und Emphysem. Das Herz war beiderseits dilatiert und mit ungeschichtetem Gerinnsel erfüllt

Zusammenfassung:

Das Versuchstier zeigt erst eine Stunde vor dem Tod ein pathol. EKG. Kein Frequenzabsinken. Das Kontrolltier stirbt schon 13 Stunden vorher.

Versuch 12.

Nr. 710 Deriphyllintier		Nr. 711 Kontrolltier	
Normal-Ekg: o. B. Frequenz : 260		Normal-Ekg: o. B. Frequenz : 250	
Vergiftung mit 10000 vol. ct. ohne Narkose			
10 Std. nach Vergiftung. — 0,5 ccm Deriph. intram.			
24 ¹ / ₂ Std.	Ekg:	Frequenz: 300	Ekg: Frequenz: 300
	I. T isoelektrisch bis flach		Kein pathologischer Befund
	II. o. B.		
	III. o. B., etwas gesenktes ST-Stück		
Noch kein Anhalt für einen Myocard-schaden			
28 Std.	0,5 ccm Deriph. intram.		27 Std. — Exitus †
	Ekg:	Frequenz: 240	Die Sektion ergab ein starkes Lungenoedem
	I. o. B.		Das Herz war beiderseits dilatiert
	II. o. B.		
III. negativ			
Kein Anhalt für einen Myocardschaden			
Exitus † in den nächsten 8 Stunden			
Die Sektion ergab ein mächtiges Lungenoedem			
Das Herz zeigte keine Dilatation			

Zusammenfassung:

Beide Tiere sterben nach 27 bzw. 36 Stunden, ohne vorher ein pathol. EKG gehabt zu haben. Das Kontrolltier zeigte allerdings bei der Sektion eine Herzdilatation, wohingegen das Versuchstier ein normales Herz hat. Das Versuchstier zeigte im letzten EKG ein Frequenzabsinken.

Versuch 13.

Nr. 380
Deriphyllintier

Nr. 381
Kontrolltier

Normal-Ekg: o. B.
Frequenz : 300

Normal-Ekg: o. B.
Frequenz : 360

Vergiftung mit 10 000 vol. ct. in Urethannarkose

9 Std. nach Vergiftung. — 0,75 ccm Deriph. intram.			
10 Std.	Ekg: I. o. B. II. T flach III. T ziemlich flach	Frequenz: 360	Ekg: I. o. B. II. T isoelektrisch III. T flach bis negativ
	Noch kein Anhalt für eine Myocard-schädigung		Noch kein Anhalt für eine Myo-cardschädigung
15 Std.	0,5 ccm Deriph. intram. Ekg: I. ST-Stück verläuft gesenkt II. T flach, ST gesenkt III. o. B.	Frequenz: 340	Ekg: Unverändert
	Läßt Myocardschaden erwarten		
30 Std.	0,5 ccm Deriph. intram. Ekg: Unverändert	Frequenz: 240	Ekg: I. T negativ II. T negativ III. T isoelektrisch
			Deutlicher Myocardschaden
33 Std.	0,2 ccm Deriph. intram. Ekg: I. ST-Stück gesenkt, T isoelektrisch bis negativ II. ST-Stück gesenkt III. T flach	Frequenz: 240	Ekg: I. T negativ bis flach II. T flach negativ III. T isoelektrisch
	Beginnender leichter Myocardschaden		Myocardschaden scheint gebessert
39 Std.	Ekg: I. T negativ II. ST-Stück gesenkt, tiefer Abgang, T flach III. o. B.	Frequenz: 240	Ekg: Unverändert
	Deutlicher Myocardschaden		

Nr. 380		Nr. 381		
Deriphyllintier		Kontrolltier		
41 ¹ / ₂ Std.	Ekg:	Frequenz: 220	Ekg:	Frequenz: 240
	Unverändert		I. T flach negativ	
	Deutlicher Myocardschaden		II. T positiv	
		III. o. B.		
		Weitere Besserung des Myocardschadens		
53 Std.	Exitus †	53 ¹ / ₂ Std. — Ekg:	Frequenz: 180	
	Die Sektion ergibt Lungenoedem, Emphysem	Bradykardie		
	Das Herz war dilatiert	I. T negativ		
		II. o. B.		
		III. o. B.		
		Deutlicher Myocardschaden		
		56 ¹ / ₂ Std. — Ekg:	Frequenz: 180	
		Bradykardie		
		I. T tief negativ		
		II. P-Aufspaltung		
		III. P-Aufspaltung		
		Myocardschaden		
		P-Aufspaltung deutet auf Vorhof-Hypertrophie		
		59 Std. — Exitus †		
		Die Sektion ergibt Lungenoedem, geringes Emphysem		
		Das Herz ist beiderseits dilatiert und mit ungeschichtetem Blutgerinnsel gefüllt		

Zusammenfassung:

Das Versuchstier stirbt mit langsam sich entwickelndem Myocardschaden. Das Kontrolltier zeigt in dem EKG von 33 Stunden und 39 Stunden nach Vergiftung eine Besserung gegenüber dem EKG von 30 Stunden nach Vergiftung insofern, als zeitweise ein negatives T₁ und T₂ und isoelektrisches T₃ flacher bzw. positiv werden.

Besprechung der Versuche.

Die Versuche sind in den folgenden drei Tabellen zusammengefaßt.

Bei den 13 mit Grünkreuzkampfstoff vergifteten Tieren wurde festgestellt, daß in 8 Fällen nach Deriphyllin-Behandlung der elektrokardiographische Befund sich zeitweise oder dauernd besserte. Bei den 13 untersuchten Kontrolltieren, die kein Deriphyllin erhalten hatten, war in 2 Fällen eine Besserung im Elektrokardiogramm sichtbar. Jedoch ist bei diesen beiden Tieren die Besserung verhältnismäßig gering, als es sich nur um ein Normalwerden eines flachen und isoelekt. T, bzw. ein Positiv- und Flacherwerden eines neg. T₁ und T₂ und isoelekt. T₃ handelt. Diese beiden Fälle zeigen, daß auch spontan ohne jede Therapie eine vorher festgestellte Durchblutungsstörung sich zurückbilden kann.

Der Schluß ist wohl berechtigt, daß nach Deriphyllineinspritzung die Herzarbeit bei mit Grünkreuzkampfstoff vergifteten Tieren im günstigen Sinne beeinflusst wurde. Die Besserung des Herzbefundes ist jedoch nicht gleichbedeutend mit einer Besserung der Prognose quoad vitam. Denn wir haben in einigen Fällen gesehen, daß trotz eines normalen elektrokardiographischen Befundes Tiere starben, während Kontrolltiere, die Zeichen eines Myocardschadens aufwiesen, den Versuch überlebten.

Wir durften freilich bei dem schweren Krankheitszustand der Grünkreuzkampfstoffvergiftung auch nicht erwarten, daß eine fast ausschließlich auf die Beeinflussung der Herztätigkeit abgestellte Therapie den tödlichen Endausgang verhindert. Hierzu bedarf es zweifelsohne der Summierung verschiedenster Behandlungsmethoden.

Ob und inwieweit dem Deriphyllin eine weniger günstige Wirkung auf das Lungenödem selbst zukommt, ist noch nicht geklärt. Es ist denkbar, daß die in allen Versuchsfällen festgestellte Diurese das akute Lungenödem in günstigem Sinne beeinflusst.

Die Versuche lassen kein Urteil darüber zu, ob Deriphyllin als Ersatz für die in der Literatur genannten und als bewährt bezeichneten bisher angewandten Kampfer- und Strophantin-Präparate in Betracht kommt; hierüber müßten Vergleichsversuche entscheiden. Jedenfalls aber beweisen unsere Versuche, daß Deriphyllin beim akuten toxischen Lungenödem nicht abzulehnen ist.

Tabelle Nr. I

5 Versuche mit 6000 ct Perstoff

Tier					Ergebnis: Elektrokardiogramm
Nr.	Behandlung: Deriph. intram.				
445	6,5 Std. nach Vergiftung	0,5	ccm		Zeitweises Verschwinden eines neg. T ₁ und isoelektrischen T ₂ . Anschl. Verschlechterung mit deutlichen Zeichen eines Myocardschadens und Coronarverschlusses
14	" " "	0,5	"		
16	" " "	0,5	"		
19,5	" " "	0,75	"		Kontrolltier stirbt fast zur selben Zeit und zeigt ebenfalls Myocardschaden
25	" " "	0,5	"		
27	" " "	Exitus			
756	13,5 Std. nach Vergiftung	0,5	ccm		Die Zeichen für einen Myocardschaden werden fortlaufend deutlicher
16	" " "	0,75	"		Keine Besserung sichtbar
18,5	" " "	0,5	"		Kontrolltier lebt 9 Stunden länger, zeigt ebenfalls Myocardschaden
20,5	" " "	0,5	"		
22,5	" " "	0,5	"		
24,5	" " "	0,75	"		
26	" " "	0,5	"		
30	" " "	0,5	"		
	Danach Exitus				
318	2,5 Std. nach Vergiftung	0,75	ccm		Die Zeichen für einen Myocardschaden werden fortlaufend deutlicher. Kontrolltier lebt 23 Stunden länger und zeigt nur geringgradig veränderte Ekg's
	9,5 " " "	0,75	"		
	16,5 " " "	0,75	"		
	22 " " "	0,75	"		
	24,5 " " "	Exitus			
242	5 Std. nach Vergiftung	0,75	ccm		Besserung zwischen dem Befund von 17 Stunden gegenüber dem von 13 Stunden insofern, als ein stark neg. T ₁ deutlich flacher wurde
	8 " " "	0,75	"		
	13 " " "	0,75	"		
	17 " " "	0,79	"		
	27 " " "	4	Exitus		Kontrolltier lebt 16 Stunden länger
274	4,5 Std. nach Vergiftung	0,75	ccm		Bis zum letzten Ekg (49,5 Stunden nach Vergiftung) völlig normale Befunde, kein Anhalt für einen Myocardschaden
	18 " " "	0,5	"		Kein Frequenzabsinken
	20 " " "	0,5	"		Das Kontrolltier zeigt pathol. Ekg's, lebt aber 40 Stunden länger
	20,5 " " "	0,5	"		
	24 " " "	0,5	"		
	33,5 " " "	0,5	"		
	41 " " "	0,5	"		
	44 " " "	0,5	"		
	47 " " "	0,5	"		
	49,5 4 " " "	0,5	"		
	53,5 " " "	Exitus			

Tabelle Nr. II

3 Versuche mit 8000 ct Perstoff

Tier					Ergebnis: Elektrokardiogramm
Nr.	Behandlung: Deriph. intram.				
714	8	Std.	nach Vergiftung	1,0 ccm	Zeichen für einen Myocardschaden werden fortlaufend deutlicher. Tier stirbt während des letzten Ekg unter dem Zeichen eines Myocardschadens und Coronarverschlusses, ohne eine Besserung gezeigt zu haben. Kontrolltier stirbt 8 Stunden nach Vergiftung
	16	"	"	1,0 "	
	19,5	"	"	0,5 "	
	21,5	"	"	0,5 "	
	26,5	"	"	0,5 "	
	38,5	"	"	Exitus	
364	17,5	Std.	nach Vergiftung	0,75 ccm	Zeichen für einen Myocardschaden werden fortlaufend deutlicher ohne eine Besserung gezeigt zuhaben. Das Kontrolltier lebt 45 Stunden länger und zeigt eine vorübergehende Besserung insofern, als ein isoelektr. T ₁ und flaches T ₂ wieder normal wurden
	20	"	"	0,5 "	
	23	"	"	0,5 "	
	27	"	"	0,5 "	
	29,5	"	"	0,5 "	
	31,5	"	"	0,5 "	
	39	"	"	Exitus	
265	4,5	Std.	nach Vergiftung	0,5 ccm	Bis zum letzten Ekg (17 Std. n. Verg.) außer einer Bradycardie keine pathol. Befunde. Das Kontrolltier überlebt, obwohl überall Zeichen für einen Myocardschaden vorhanden sind
	7	"	"	0,5 "	
	10,5	"	"	0,5 "	
	17	"	"	0,5 "	
	19	"	"	Exitus	

Tabelle Nr. III

5 Versuche mit 10 000 ct Perstoff

Tier Nr.	Behandlung: Deriph. intram.				Ergebnis: Elektrokardiogramm
712	2	Std.	nach Vergiftung	1,0 ccm	Ein 11 Stunden nach Vergiftung nachweisbarer Myocardschaden (neg. T ₁ und neg. T ₂) wird behoben. Bis zum letzten Ekg, 8 Std. vor Exitus, kein patholog. Befund zu erheben. Kontrolltier lebt nur 23 Stunden und zeigt Myocardschaden
	3,5	"	"	0,5 "	
	7	"	"	0,5 "	
	11	"	"	0,5 "	
	23,5	"	"	0,5 "	
	27	"	"	1,0 "	
	Exitus innerhalb der nächsten 8 Std.				
605	1,5	Std.	nach Vergiftung	0,5 ccm	Zeitweise Besserung zwischen dem Ekg von 1,5 Std. und 6 Std. nach Vergiftung insofern, als ein neg. T ₂ und T ₃ verschwinden. Doch später Auftreten eines deutlichen Myocardschadens. Kontrolltier stirbt nach 34 Std. und zeigt fortl. sich verstärkenden Myocardschaden
	6,5	"	"	0,75 "	
	11,5	"	"	0,75 "	
	19	"	"	0,75 "	
	24	"	"	0,75 "	
	26	"	"	Exitus	
694	0,5	Std.	nach Vergiftung	0,65 ccm intrav.	Erst eine Stunde vor Exitus Auftreten eines pathol. Befundes Kontrolltier stirbt 13 Stunden vorher und zeigt fortlaufend sich verstärkenden Myocardschaden
	18	"	"	0,65 ccm intram.	
	24	"	"	0,75 ccm intram.	
	41	"	"	0,75 ccm intram.	
	44	"	"	0,75 ccm	
	45	"	"	Exitus	
	710	10	Std.	nach Vergiftung	
28		"	"	0,5 "	
Exitus in den nächsten 8 Stunden					
380	9	Std.	nach Vergiftung	0,75 ccm	Die Zeichen für einen Myocardschaden werden fortlaufend deutlicher. Keine Besserung sichtbar. Kontrolltier stirbt 6 Stunden später und zeigte eine zeitweise Besserung insofern, als ein vorher neg. T ₁ und T ₂ und isoelektr. T ₃ flacher bzw. positiv wurden.
	15	"	"	0,5 "	
	30	"	"	0,5 "	
	33	"	"	0,2 "	
	53	"	"	Exitus	

Zusammenfassung:

Elektrokardiographisch konnte bei mit Grünkreuzkampfstoff vergifteten Tieren nach Deriphyllingabe eine zeitweise, selten eine dauernde Besserung festgestellt werden.

Der tödliche Ausgang der Grünkreuzvergiftung wurde jedoch durch Deriphyllin nicht verhindert.

Zum Schluß bitte ich Herrn Oberstarzt Dr. M u n t s c h für die Überlassung des Themas und die Unterstützung bei meiner Arbeit danken zu dürfen.

Schrifttum.

- Addarii und Freundlich: Arch. f. Exper. Path. 1937, 185, 4—6 (— 3 —).
Bibus: Med. Klinik, 1938, Nr. 3 (— 11 —).
Büchner, Weber und Hagner: Koronarthrombose, Koronarinsuffizienz. Verlag Thieme, Leipzig 1935.
Brundieck: Med. Klinik, 1937, Nr. 18 (— 9 —).
Faltitschek: Therapie d. Gegenwart, 1935, Nr. 1 (— 5 —).
Frey und Heß: Ztschr. f. d. ges. experiment. Medizin, Bd. 101, 4. Heft (— 2 —).
Gildemeister: Ztschr. f. d. ges. experiment. Medizin, Bd. 113 (— 14 —).
Hadorn: „Praxis“. Schweizer Rundschau für Medizin, 26. Jg., Nr. 20 (— 10 —).
Laqueur und Magnus: „Über Kampfgasvergiftungen“. Ztschr. f. d. ges. exper. Medizin, 1921, Bd. 113.
Lehr: Med. Klinik, 1936, Nr. 42 (— 7 —).
Lueg und Weber: Ztschr. f. ärztl. Fortb., 1938, Nr. 11 (— 13 —).
Lürmann und Lauer: Therapie d. Gegenwart, 1933, Heft 6 (— * —).
Lürmann: Therapie d. Gegenwart, 1935, Heft 3 (— 6 —).
Meier und Gottlieb: Die experimentelle Pharmakologie, Urban & Schwarzenberg, 1936.
Muntsch: Leitfaden d. Pathologie u. Therapie d. Kampfstoffkrankungen. 4. Aufl. Verlag Thieme, Leipzig 1936.
Muntsch: Über die therap. Beeinflussung d. Herzschwäche beim akuten, toxischen Lungenödem der Kampfstoffvergiftungen. Med. Welt, 1934, Nr. 34.
Rißmann, Fortschritte d. Therapie 1937, Nr. 1 (— 8 —).
v. Törne: Dt. Med. Woschr. 1935, Nr. 40 (— 4 —).
Weber: Die Elektrokardiographie. Verlag Jul. Springer, 1935.
Weber: Therapie d. Gegenwart 1938, Heft 1 (— 12 —).

Lebenslauf.

Ich wurde am 27. April 1913 als Sohn des prakt. Arztes Dr. med. Arthur Werner und seiner Frau Marie geb. Cyriacus in Borna bei Leipzig geboren. Ich besuchte dort zunächst die Volksschule, später das Staatsrealgymnasium, wo ich Ostern 1932 die Reifeprüfung bestand. Vom Sommersemester 1932 ab begann ich das Studium der Medizin an der Universität Kiel. Dort bestand ich Ostern 1935 die ärztliche Vorprüfung. Am 1. November 1935 unterbrach ich mein Studium und trat als Freiwilliger bei der 14./Inf.-Regt. 26 in Flensburg ein. Während der Dienstzeit bewarb ich mich um Übernahme als Sanitäts-Offiziers-Anwärter in das Sanitätskorps. Vom 1. April 1936 ab wurde ich an die militärärztliche Akademie kommandiert und setzte mein medizinisches Studium an der Universität Berlin fort. Dort bestand ich am 30. Juli 1938 das ärztliche Staatsexamen und leistete im Anschluß daran mein praktisches Jahr als Unterarzt im Heeres-Standortlazarett Küstrin ab.

